



9.0 Définitions

1. Codes d'origine ethnique

01. Canadienne
02. Anglaise
03. Chinoise
04. Française
05. Indienne
06. Italienne
07. Allemande
08. Écossaise
09. Crie
10. Mi'kmaq
11. Salish
12. Métisse
13. Inuite
14. Philippine
15. Irlandaise
16. Néerlandaise
17. Ukrainienne
18. Polonaise
19. Portugaise
20. Vietnamiennne
21. Coréenne
22. Jamaïcaine
23. Grecque
24. Iranienne
25. Libanaise
26. Mexicaine
27. Somalienne
28. Colombienne
29. Autre origine ethnique
30. Inconnu

Codes de race

01. Noire (Africaine, Afro-Antillaise, Afrodescendante)
02. Asiatique de l'Est et du Sud-Est (Chinoise, Coréenne, Japonaise, Philippine ou ascendance taïwanaise, Vietnamiennne, Cambodgienne, Thaïlandaise, Indonésienne)
03. Autochtone (Premières Nations, Métisse, Inuite)
04. Hispanique (Latino-Américaine, ascendance hispanique)
05. Moyen-Orient (Arabe, Perse, ascendance d'Asie occidentale [Afghane, Égyptienne, Iranienne, Libanaise, Turque, Kurde, etc.])
06. Asiatique du Sud (Indienne, Pakistanaise, Bangladaise, Sri Lankaise, Indo-Caraïbienne)
07. Blanche (Européenne)
08. Autre race
09. Inconnue

2. Problèmes de grossesse (antécédents, post-partum ou grossesse concernée)

- Santé physique
- Santé mentale
- Stress social
- Stress émotionnel
- Événement thromboembolique
- Embolie amniotique
- Pré-éclampsie
- 3 avortements spontanés ou plus
- Accouchement prématuré ou mort fœtale au deuxième trimestre
- Placenta praevia hémorragique
- Diabète gestationnel
- Hématome rétroplacentaire important



- Hémorragie post-partum nécessitant une transfusion
- Psychose puerpérale
- Dépression post-partum grave
- Tentative de suicide
- Mort néonatale
- Mortinaissance
- Bébé avec une anomalie congénitale majeure
- Hypotrophie néonatale
- Hypertrophie néonatale
- Nourrisson nécessitant des soins intensifs
- Intervention chirurgicale pendant la grossesse
- Hyperémèse nécessitant une hospitalisation
- Déshydratation nécessitant une hospitalisation
- Syndrome d'hyperstimulation ovarienne
- Infection grave (p. ex. : pyélonéphrite)

3. Problèmes de santé prénataux ou préexistants

- Hypertension artérielle essentielle (non liée à la grossesse)
- Néphropathie
- Trouble neurologique
- Trouble endocrinien
- Trouble hématologique
- Maladie auto-immune
- Maladie gastro-intestinale
- Cancer
- Maladie infectieuse (p. ex. VIH, tuberculose)
- Trouble de santé mentale

4. Date prévue d'accouchement (DPA)

Utiliser la meilleure estimation (échographie ou date de la dernière menstruation) d'après la datation sur 40 semaines d'aménorrhée.

5. Morbidité maternelle majeure

- État végétatif persistant
- Arrêt cardiaque
 - Accident vasculaire cérébral
 - Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte
 - Coagulopathie intravasculaire disséminée
 - HELLP
 - Œdème pulmonaire
 - Syndrome de Mendelson
 - Insuffisance rénale
 - Événement thrombotique
 - Septicémie
 - Ventilation nécessaire
 - Autre morbidité

6. Complications chez le fœtus ou le nourrisson

- Syndrome de détresse respiratoire
- Hémorragie intraventriculaire
- Entérocolite nécrosante
- Encéphalopathie néonatale
- Maladie pulmonaire chronique
- Ictère grave nécessitant une photothérapie
- Anomalie congénitale
- Infection grave (p. ex. : septicémie, méningite)
- Exsanguinotransfusion
- Autre complication